



R1C-ENR014 Version 5

Enregistrement Préconisations Test post coïtal de Hühner

Intérêt :

Permet de vérifier dans des conditions naturelles, l'aptitude des spermatozoïdes à migrer du vagin vers les voies génitales supérieures

Préconisations avant le prélèvement

- Prendre rendez-vous au laboratoire pendant la période ovulatoire. Cette période est déterminée par le gynécologue et précisée sur l'ordonnance. En l'absence d'indication le prélèvement sera réalisé en fonction des courbes de température, soit en général le 12^e ou 13^e jour du cycle (avant la montée de la courbe thermique si la patiente prend sa T° tous les jours avant de se lever).

Pour l'homme :

- Respecter un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 5 jours avant le rapport sexuel du test de Hühner.
- Le couple doit avoir un rapport sexuel, sans protection 9 à 12 heures avant le prélèvement.

Pour la femme :

- Ne pas réaliser de toilette intime entre le rapport et l'examen au laboratoire



R1C-ENR014 Version 5

Enregistrement Préconisations Test post coïtal de Hühner

Intérêt :

Permet de vérifier dans des conditions naturelles, l'aptitude des spermatozoïdes à migrer du vagin vers les voies génitales supérieures

Préconisations avant le prélèvement

- Prendre rendez-vous au laboratoire pendant la période ovulatoire. Cette période est déterminée par le gynécologue et précisée sur l'ordonnance. En l'absence d'indication le prélèvement sera réalisé en fonction des courbes de température, soit en général le 12^e ou 13^e jour du cycle (avant la montée de la courbe thermique si la patiente prend sa T° tous les jours avant de se lever).

Pour l'homme :

- Respecter un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 5 jours avant le rapport sexuel du test de Hühner.
- Le couple doit avoir un rapport sexuel, sans protection 9 à 12 heures avant le prélèvement.

Pour la femme :

- Ne pas réaliser de toilette intime entre le rapport et l'examen au laboratoire