



R1C-ENR012 Version 3

Enregistrement Préconisations Scotch test Recherche d'oxyures

Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons anales (Prurit nocturne) et troubles du sommeil.

Matériel nécessaire

- Toujours utiliser un **scotch transparent non opaque**
- Un jeu de 2 lames fourni par le laboratoire

Préconisations pour le prélèvement :

La veille au soir, effectuer une toilette de la marge anale

Le matin avant la toilette et les premières selles :

- Décoller le scotch de son support sur environ 5 cm.
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support en évitant de faire des bulles d'air. En effet, cette lame sera observée au microscope, et les bulles peuvent gêner l'examen.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Se laver les mains
- Renseigner les informations suivantes

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	
Date du prélèvement : ___ / ___ / ___	Heure du prélèvement : ___ h ___
Date du prélèvement : ___ / ___ / ___	Heure du prélèvement : ___ h ___

- Noter sur les lames au crayon à papier : Nom, prénom et date de naissance
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les 24h, accompagné de cette fiche.

Attention : Tout échantillon ne portant pas les informations demandées pourra être refusé



R1C-ENR012 Version 3

Enregistrement Préconisations Scotch test Recherche d'oxyures

Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons anales et troubles du sommeil.

Matériel nécessaire

- Toujours utiliser un **scotch transparent non opaque**
- Un jeu de 2 lames fourni par le laboratoire

Préconisations pour le prélèvement :

La veille au soir, effectuer une toilette de la marge anale

Le matin avant la toilette et les premières selles :

- Décoller le scotch de son support sur environ 5 cm.
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support en évitant de faire des bulles d'air. En effet, cette lame sera observée au microscope, et les bulles peuvent gêner l'examen.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Se laver les mains
- Renseigner les informations suivantes

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	
Date du prélèvement : ___ / ___ / ___	Heure du prélèvement : ___ h ___
Date du prélèvement : ___ / ___ / ___	Heure du prélèvement : ___ h ___

- Noter sur les lames au crayon à papier : Nom, prénom et date de naissance
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les 24h, accompagné de cette fiche.

Attention : Tout échantillon ne portant pas les informations demandées pourra être refusé